

# Fetálny alkoholový syndróm (FAS)



Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je najzávažnejšou poruchou spomedzi tzv. porúch fetálneho alkoholového spektra (FASD). FASD vznikajú u dieťaťa, ktorého matka požívala alkohol počas tehotenstva. Alkohol je teratogén, teda látka, ktorá negatívne ovplyvňuje celý vývin plodu a to najmä centrálnu nervovú sústavu, ale aj celkový vzrast, či dysmorfii niektorých tvárových čŕt.

Ide o tzv. skryté postihnutie (podobne ako autizmus), teda nie je vidieť na prvý pohľad. Prejavy tohto znevýhodnenia závisia od množstva požitého alkoholu a od obdobia tehotenstva, v ktorom bol požitý. Najviac postihnutý bude taký jedinec, ktorého mama pila alkohol počas celého tehotenstva vo veľkých množstvách. Nie každej žene, ktorá v tehotenstve pila alkohol sa narodí dieťa s FASD. Musíme však poznamenať, že aj jednorazové, príležitostné pitie alkoholu počas gravidity môže ovplyvniť vývin jedinca. A to aj v prípade prvých týždňov, kedy žena ešte často nevie, že je tehotná.

Deti s FASD sú veľmi živé, komunikatívne a nadané v rôznych kreatívnych či športových smeroch. Okolie ich často vníma len ako nevychované. Za ich správaním sa však skrýva poškodenie mozgu, ktoré ovplyvňuje ich kognitívne funkcie (vrátane ním poznávame svet - pamäť, reč, myslenie, pozornosť, plánovanie...) zmyslové vnímanie, či motorické fungovanie. Je dôležité vedieť, v ktorých konkrétnych oblastiach má postihnuté dieťa deficit, aby na neho nebol vyvíjaný nátlak a prehnané nároky. Taktiež je dôležité uvedomiť si, že deti s FASD boľú v mnohých prípadoch opustené ich biologickou matkou, takže v ich štatovacom balíku do života sa okrem iného nachádza aj trauma z opustenia, pobyt v detskom domove, resp. časté striedanie v náhradnej starostlivosti, s čím súvisí aj narušená raná vzťahová väzba. Tá priamo súvisí so všetkými sociálnymi vzťahmi v ďalšom živote dieťaťa.

Výskyt FASD (<http://assistentia.sk/index.php/sk/diagnozy/fasd>) [2]

- Úplne rozvinutý FAS (fetálny alkoholový syndróm) sa vyskytuje: u 0,2 – 2 detí z 1000 živonarodených detí.
- FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra) sa vyskytujú: u 3-40 detí na 1000 narodených detí, na Slovensku nie je kvantifikovaný (Na internete koluje štatistika, že na Slovensku sa ročne rodí 250 detí s FAS. Odhaduje sa, že detí s FASD sa rodí omnoho viac). Nepresnosť údajov je spôsobená nedostatkom diagnostiky FASD.
- U žien, ktoré konzumujú alkohol pravidelne, sa vyskytuje až u 30% detí.
- Výskyt FASD medzi školákmi sa odhaduje až na 2-5% v USA a Západnej Európe.
- FASD sa vyskytuje v populácii vo väčšej miere ako Downov syndróm, svalová dystrofia, alebo Spina Bifida („otvorený chrbátik“).

Zdroj [www.fascentrum.sk](http://www.fascentrum.sk) [3]

Zdroj <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19731384> [4]

hot\_news\_pravy

Po, 09/12/2016 - 10:20 — mamata

[Naše dieťa](#)  
[Mamička](#)  
[Otecko](#)  
[Starí rodičia](#)  
[Rodina](#)

[Reklama](#)

[Kto sme](#)

[Kontakt](#)

[Mapa stránok](#)

- [FaceBook](#)
- [Twitter](#)
- [Rss](#)

© 2001 - 2011 Spoločnosť Impresa Art, s.r.o.  
Všetky práva vyhradené.  
[Privátna politika](#) | [Autorské práva](#)



**Zdrojová URL:** <http://mamata.sk/mamatata/node/456252>

**Linky:**

- [1] [http://mamata.sk/mamatata/sites/default/files/nie\\_alkohol.jpg](http://mamata.sk/mamatata/sites/default/files/nie_alkohol.jpg)
- [2] <http://assistentia.sk/index.php/sk/diagnozy/fasd>
- [3] <http://www.fascentrum.sk/>
- [4] <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19731384>